
FRONTLINE®



Gest miłości, któremu możesz zaufać.



Pchły



Pchła kocia

Pchły, podobnie jak kleszcze, są pasożytami żywiącymi się krwią ludzi i zwierząt, wywołując przy tym poważne podrażnienia skóry.

Niejednokrotnie u szczeniąt i kociąt, przy silnej inwazji pcheł, może dochodzić do znacznej utraty krwi, a co za tym idzie, do anemii. Pchły są również częstą przyczyną poważnych schorzeń skóry, tj.: alergiczne pchle zapalenie skóry (APZS). Pasożyty te mogą być również źródłem tasiemców dla ludzi, psów i kotów.



Pchła psia



Należy jednak pamiętać, iż w odróżnieniu od kleszczy, „sezon na pchły" trwa cały rok. Pchły znajdują w Twoim domu kryjówkę w dywanach, wykładzinach oraz pod meblami. Ponadto włączenie ogrzewania w okresie zimowym powoduje ich ożywienie.

Jak rozpoznać zapchlone zwierzę?

Pierwszym symptomem zapchlenia zwierzęcia jest uporczywe drapanie się. Rozsuwając włos pupila w okolicy jego ogona, uszu lub szyi można zauważyć drobiny pchlego kału (z wyglądu przypominającego fusy kawy).

Pchły należy zwalczać przez cały rok

Zapobieganie

Jakość preparatu **FRONTLINE®** została potwierdzona licznymi badaniami laboratoryjnymi i klinicznymi oraz przez miliony właścicieli zwierząt stosujących ten środek na całym świecie.

- **FRONTLINE®** zabija 98-100% pcheł w ciągu 8-24 godzin*.
- Likwiduje pchły zanim zdążą złożyć jaja.
- Jednokrotne podanie preparatu **FRONTLINE®** zapobiega ponownej inwazji pcheł przez 3 miesiące u psów i 5-6 tygodni u kotów (w zależności od zastosowanej formy, tzn. Spray lub Spot-On).
- **FRONTLINE®** eliminuje pchły ze środowiska bytowania zwierząt.

Opadająca np. na dywany i legowiska sierść zwierząt (po uprzednim zastosowaniu preparatu *FRONTLINE*) nadal działa owadobójczo. Nie ma więc konieczności stosowania w domu innych dodatkowych preparatów przeciwko tym pasożytom.




Wysoka skuteczność FRONTLINE® gwarantuje zadowolenie właścicieli i bezpieczeństwo ich pupili.

Kleszcze
są wszechobecne w Polsce

Kleszcze to pasożyty charakteryzujące się zdolnością przystosowawczą do każdego typu klimatu i środowiska. Niektóre gatunki bytują w lasach, parkach, na łąkach lub w terenie niezagospodarowanym, inne z kolei opanowują głównie miejsca przebywania psów.

W Polsce inwazję kleszczy obserwuje się w okresie wiosennym. Jednak ich największy wzrost występuje wczesną jesienią.

Sezonowość populacji kleszczy



Źródło: Merial Ltd.



Rhipicephalus sanguineus

Dermacentor reticulatus

Dermacentor reticulatus opuszcza jajo



Ixodes Spp

W Polsce występują 3 podstawowe gatunki kleszczy: *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*. Działanie pasożytnicze kleszczy polega na żywieniu się krwią ludzi i zwierząt, stanowiąc przy tym poważne zagrożenie dla ich zdrowia. Kleszcze są nosicielami wielu chorób, niekiedy ciężkich, a nawet śmiertelnych.

Kleszcze to nosiciele licznych chorób śmiertelnych

Do najczęściej spotykanych chorób, przenoszonych przez kleszcze zalicza się: **Babeszjozę, Boreliozę (Choroba z Lyme), Ehrlichiozę, Hepatozoonozę, Porażenie pokleszczowe, Ropne zakażenie skóry psów i kotów.**

Jak rozpoznać zaatakowane przez kleszcze zwierzę?



Głodny kleszcz (o wielkości 2-5 mm) wbija się w skórę zwierzęcia i zaczyna ssać krew. Najedzony potrafi zwiększyć swoje rozmiary do wielkości ziarnka grochu. Wówczas na zewnątrz widoczny jest tylko szarobiały odwłok. Po nasyceniu się krwią odpada, zakażając organizm żywiciela.

Zapobieganie

- Zapobiega inwazji kleszczy przez co najmniej 3-4 tygodnie.
- Eliminuje ponad 90% kleszczy przed upływem 48 godzin*, tj. przed okresem kiedy występuje największe ryzyko zakażenia chorobami śmiertelnymi.
- Skutecznie zwalcza 3 główne gatunki kleszczy występujące w Polsce.

FRONTLINE®
został stworzony dla ochrony zwierząt.



FRONTLINE® - naprawdę skuteczny środek przeciw pasożytom zewnętrznym, niezawodny w walce z kleszczami.

*) Evaluation of the speed of kill of fleas and ticks with fipronil or imidacloprid. Cruthers L., Guerro J.& Robertson-Plouch C. World Veterinary Congress, September 1999, Lyon, France.

Sposób podawania

Stosowanie FRONTLINE®

Przed podaniem preparatu zaleca się dokładne zapoznanie z poniższą instrukcją lub treścią ulotki na opakowaniu.



FRONTLINE® Spot On



Wyjmij pipetkę z opakowania. Podważ i usuń aluminiową osłonkę chroniącą pipetkę. Otwórz pipetkę. Trzymając ją pionowo, z dala od twarzy i ciała - odłam jej końcówkę wzdłuż zaznaczonej linii.



Nanieś preparat bezpośrednio na skórę. Wprowadź końcówkę pipetki, aż do samej skóry między łopatkami zwierzęcia, uprzednio rozgarniając sierść. Wyciśnij dokładnie całą zawartość pipetki na skórę między łopatkami:



u kotów w dwóch miejscach na skórze między łopatkami.



u psów w jednym miejscu na skórze między łopatkami.

FRONTLINE® Spray

Po naniesieniu preparatu FRONTLINE, jego substancja czynna (Fipronil) zacznie penetrować naturalną warstwę tłuszczową pokrywającą skórę i sierść. Szybko rozprzestrzeni się po całym ciele Twojego zwierzęcia zapewniając długotrwałą ochronę przed pchłami, kleszczami i wszołami.

Chroń swoje zwierzę, stosuj FRONTLINE® i łap trop na www.zabijkleszcza.pl

Frontline Spot-On

Skład: Fipronil 10g/100ml, roztwór do nakrapiania. **Preparat w konfekcjach:** Frontline Spot On Koty (pipeta 0,5 ml), Frontline Spot On Psy S (pipeta 0,67 ml), Frontline Spot On Psy M (pipeta 1,34 ml), Frontline Spot On Psy L (pipeta 2,68 ml), Frontline Spot On Psy XL (pipeta 4,02 ml). **Wskazania (psy, koty):** Do stosowania leczniczego i zapobiegawczego u psów i kotów opadniętych przez: pchły, kleszcze, wszoły. Do zapobiegania i leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry. **Przeciwskazania:** Nie należy stosować preparatu u kociąt i szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni i/lub o wadze poniżej 1 kg (koty) lub 2 kg (psy). Nie stosować u kotów i psów chorych (choroby układowe, stany gorączkowe) lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików, u których preparat może wywoływać objawy niepożądane, a nawet prowadzić do śmierci. **Dawkowanie:** Koty - maksymalna zalecana dawka: 25 mg/kg mc. Psy - maksymalna zalecana dawka: 13 mg/kg mc. Podawać miejscowo na skórę. Podmiot odpowiedzialny: Merial S.A.S. **Przed użyciem, zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.**

Frontline Spray aerozol natryskowy dla psów i kotów

Butelki o pojemności 100 ml i 250 ml z pompką rozpylającą po 0,5 ml i 1,5 ml preparatu odpowiednio. **Skład:** Fipronil 250 mg/100 ml. **Wskazania:** Do stosowania leczniczego i zapobiegawczego u psów i kotów opadniętych przez pchły, kleszcze i wszoły. **Przeciwwskazania:** Nie stosować u zwierząt chorych (choroby układowe, stany gorączkowe) lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików, u których preparat może wywoływać objawy niepożądane a nawet prowadzić do śmierci. **Dawkowanie:** Minimalny okres pomiędzy kolejnymi zabiegami powinien wynosić 4 tygodnie. W zależności od długości włosa podawać 3 do 6 ml preparatu na 1 kg masy ciała (tj. 7,5-15 mg fipronilu na 1 kg mc), co odpowiada 2 do 4 naciśnięciom pompki dozownika butelki 250ml oraz 6 do 12 naciśnięciom pompki dozownika butelki 100 ml. Skuteczne działanie preparatu wymaga nawilżenia włosów (sierści) na całej ich długości. Podmiot odpowiedzialny: Merial S.A.S. **Przed użyciem, zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.**

MERIAL
VetTrade Farmaceutyki dla zwierząt
Vet-Trade Polska Sp. z o.o., ul. Słoneczna 223A, 05-506 Lesznowola, tel.: 022 737 63 01÷02, **www.vettrade.pl**