Proszek do podania na skórę dla psów, kotów i gołębi, stosowany do zwalczania inwazji ektopasożytów występujących u psów, kotów i gołębi (pchły, kleszcze, wszoły, obrzeżki)

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Permetryna (jako permetryna cis/trans 25:75) 10 mg / g

WSKAZANIA LECZNICZE

Zwalczanie inwazji ektopasożytów występujących u psów, kotów i gołębi (pchły, kleszcze, wszoły, obrzeżki).

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u szczeniąt i kociąt poniżej 12 tygodnia życia, u gołębi poniżej 1 miesiąca życia, a także u samic karmiących.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

U kotów objawy zatrucia po przedawkowaniu manifestują się wystąpieniem zaburzeń neurologicznych pochodzących z ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Objawy występujące bardzo często (> 1/10): ślinotok, nadpobudliwość która może czasem przechodzić w stan agresji, drżenie mięśni, drgawki, niezborność ruchowa, przeczulica skórna, rozszerzenie źrenic, hipertermia. Objawy występujące często (< 10/100): tachykardia, letarg, dezorientacja, wymioty. Objawy występujące bardzo rzadko (<1/10000): hipotermia, arytmia, zapaść, sinica błon śluzowych, biegunka, zatrzymanie oddechu, zatrzymanie akcji serca, zatrzymanie moczu, przemijająca ślepota. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DAWKOWANIE I DROGI PODANIA

Posypać proszkiem powłokę rozchylając sierść lub pióra tak, aby produkt leczniczy dotarł do skóry. Zabieg należy powtórzyć po 2 – 3 tygodniach. Każdorazowo po przeprowadzonym

zabiegu należy wymienić posłanie zwierzęcia, a nowe legowisko posypać niewielką ilością produktu leczniczego, w przypadku stosowania u gołębi opylać kojce.

Opakowanie 50 g produktu leczniczego wystarcza do przeprowadzenia: - 3 zabiegów u psów o ciężarze 10 – 15 kg
- 5 do 7 zabiegów u kotów
- 10-15 zabiegów u szczeniąt i kociąt
- 25 do 50 zabiegów u gołębi.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Posypać proszkiem powłokę rozchylając sierść lub pióra tak, aby produkt leczniczy dotarł do skóry. Zabieg należy powtórzyć po 2 – 3 tygodniach. Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu należy wymienić posłanie zwierzęcia, a nowe legowisko posypać niewielką ilością produktu leczniczego, w przypadku stosowania u gołębi opylać kojce.

OKRES KARENCJI

Pies, kot - Nie dotyczy.
Nie stosować u gołębi których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25^0 C.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W czasie wykonywania zabiegu chronić oczy zwierząt ! Zabieg powinien być wykonywany poza pomieszczeniem mieszkalnym. W czasie wykonywania zabiegów stosować ogólnie przyjęte środki ostrożności postępowania z preparatami pasożytobójczymi. Po zastosowaniu produktu leczniczego należy chronić dzieci przed kontaktem ze zwierzęciem. Nie stosować u samic karmiących. Przy przedawkowaniu preparatu należy podjąć intensywne leczenie objawowe, ponieważ nie istnieje swoiste antidotum. Zaleca się podanie leków o działaniu uspokajającym, przeciwdrgawkowym (diazepam, pentobarbital, propofol) i miorelaksacyjnym. Należy uzupełnić płyny przez podanie krystaloidów (fizjologicznego roztworu chlorku sodu lub płynu wieloelektrolitowego). Zaleca się również kąpiel zatrutego zwierzęcia w letniej wodzie z dodatkiem łagodnych detergentów w celu zmycia pozostających na skórze resztek permetryny.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU

Produkt leczniczy silnie toksyczny dla pszczół, ryb, skorupiaków. Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

50g

OKRES WAŻNOŚCI

2 lata

WYDAWANY BEZ WYSTAWIANIA RECEPTY

WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT

INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Pozwolenie nr 742/99